

本草蒙筌

本草蒙筌卷之二

新安和門月朋陳嘉謨廷采纂輯

門生

歙邑葉棐 鮑倚
姪胡一貫 姪晨

校刊

草部中

香薷

味辛氣溫升也陽也無毒生川蜀名嶺南者

實而重狀如用治凡病證俱優產歷陽嶺南名焉

荷葉

者根節大莖細含止齒根血搗外可治關中所

種開中古西京多功專療偏頭疼出台州

只散風去濕荷葉出撫郡西江惟開鬱寬胸餘產入

藥不堪煮湯浴身則可一名香葉實載圖經秋採曝

乾極疴形擇重實繫白勿謂惡黃耆山茱狼毒畏硝

石滑石黃連反藜蘆使白芷乃手少陽本經之藥又

入手足厥陰二經堪佐升麻升提氣血止本經頭痛

血虛頭痛之不可遺餘經頭痛亦用散肝經諸風

頭面遊風之不可缺上行頭目下行血海疏肝經血

中之氣藥也治一切血破癥結宿血而養新血及鼻

洪吐血溺血婦人血閉無娠治一切氣厥心腹結氣

諸般積氣併脇痛痰氣疝氣中惡卒痛氣塊排膿消

瘀長肉蕪理外科溫中燥濕散寒專除外感得牡蠣

療頭風旋暈吐逆得細辛治金瘡作痛呻吟同生地

黃酒煎禁崩漏不止用陳艾湯調末試胎孕有無人

經斷三四月用此藥服之所忌須知單服久服犯則
腹內覺動是孕否則病也所忌須知單服久服犯則
走散真氣令人暴亡務加他藥佐之中病便已
一 係芎藭葉地產又尚雍州 卻風眩止泄瀉除
毒鬼疰主欬逆驚癇

張希

謨按芎藭不宜單服久服犯則走散真氣令人暴
亡無乃因其氣味辛溫辛甘發散之過用溪管此
示人也又古一婦感患頭風服芎半年一旦暴死
亦載經註垂戒叮嚀迹此觀之芎散之禍信弗輕
矣故今明醫每用四物湯治虛怯勞傷減去其芎
亦鑒此轍奈何鄉落愚民罔明藥性時採土芎煎
茶謂啜香美體氣稍實僥倖無虞儻涉虛羸鮮不

蒙其禍者。惟歸天命。果真天作孽耶。抑自作孽耶。

芍藥

味苦酸。氣平微寒。氣薄味厚。可升可降。陰中之

陽。有小毒。近道俱生。淮南獨勝。開花雖顏色五品。入

藥。惟赤白二根。山谷花葉單。根重實有力。家園花葉

盛。根輕虛。無能反。藜蘆惡。硝斛碎。縮長。硝石。鼈甲小

煎。使為藥。沒藥。雷丸。入手太陰肺經。及足太陰脾。騰

赤白因異。製治亦殊。**赤芍藥**色應南方。能瀉能散。生

用正宜。**白芍藥**色應西方。能補能收。酒炒纔妙。若補

浸見火燥亦利小便。去熱消癰。腫破積堅。主火盛眼疼。

要藥。白和血。脉緩中。固腠理。止瀉痢。為血虛腹痛捷

方。已後數條。惟白可用。得甘草為輔佐。兼主治寒。

熱腹疼。熱加黃芩。寒加肉桂。與白朮同用。補脾。與參
耆同用。益氣。與川芎同用。瀉肝。凡婦人產後諸病。切
忌煎葷。因其酸寒。恐伐生發之性。故也。儻不得已。要
用。桂酒麴醱。漬炒。少加。血虛寒人。亦禁。莫服。經云。冬
月。減芍藥。以避中寒。則可徵矣。

謹按芍藥。何入手足太陰也。蓋酸澀者爲上。爲收。
欽。傳濕之劑。故爾。雖主手足太陰。終不離於收降
之體。又至血海。而入九地之下。直抵於足厥陰焉。
氣味酸收。又何利小便也。蓋腎主大小二便。用此
益陰滋濕。故小便得通。仲景治傷寒。每多用者。抑
非以其主寒熱利小便乎。一說。芍藥本非通利之

藥因其能停諸濕而益津液故小便自利於義亦通又何謂緩中也蓋損其肝者緩其中即調血止痛之謂丹溪云芍藥惟止血虛腹痛然諸痛並宜辛散此僅酸收故致血調血調則痛自止豈非謂緩中耶

黃芩

味苦氣平大寒味薄氣厚可升可降陰也陰中

微陽無毒所產尚彭城屬凡用擇深色剔去內朽

刮淨外衣薄片咀成生炒如式卑惡慈實勿令同煎

畏丹砂牡丹藜蘆用山茱龍骨引使枯飄者名宿參

入手太陰上膈酒炒爲宜堅實者名宿參入手陽明

下焦生用最妙宿參瀉肺火消痰利氣更除濕熱不

留積於肌表間。子芩瀉大腸火。養陰退陽。又滋化源。

常克溢於膀胱內。一赤痢頻併可止。一赤眼脹痛能。

消得五味蒙蠟。五味子北蠟育妊姪得白朮砂仁安胎。

孕療鼠瘻同耆欬赤豆。黃耆白豆治腹疼同厚朴黃。

連又煎小清空膏。載冊單味而清頭腦。總除諸熱收。

盡全功。研細煎湯治腸澼膿血。

黃連

味苦氣寒。味厚氣薄。可升可降。沉也。陰也。陰中。

微陽無毒。

宣

宣城屬南直隸

肥

麓苗少。收者

生

川省。瘦小苗多。帶苗並取去苗麤。鷹爪連珠。不必分地土。

優劣。日曝待甚乾燥。

布裹按落音淨。鬚苗治諸火邪。依。

各製炒火在上。炒以醇酒。火在下。炒以童便。實火朴。

各製炒火在上。炒以醇酒。火在下。炒以童便。實火朴。

硝。虎火。礬醋。煖火。蠶汁。伏火。鯢。馱。下。鹽湯。氣滯火同。

吳茱萸。血。瘕。火。拌。乾。漆。末。食。積。瀉。亦可。服。陳。壁。土。東。

研。炒。之。細。調。水。和。炒。研。肝。膽。火。盛。欲。毆。必。求。猪。膽。

汁。炒。又。治。赤。眼。人。乳。浸。蒸。或。點。或。吞。立。能。却。痛。勝。烏。

附。鵝。子。頭。畏。欬。冬。惡。荒。菊。荒。花。玄。參。忌。猪。肉。冷。水。爲。使。

黃。芩。龍。骨。入。手。少。陰。心。經。巴。豆。遇。之。其。毒。即。解。可。焚。

膏。煎。液。任。合。散。爲。丸。香。連。丸。廣。木。香。和。攪。爲。腹。痛。下。

痢。要。藥。茱。萸。連。丸。吳。茱。萸。佐。助。乃。吞。吐。酸。水。神。方。如。止。

消。渴。便。多。卑。研。蜜。丸。亦。効。同。枳。殼。治。血。痔。同。當。歸。治。

眼。癢。佐。桂。蜜。煎。服。空。心。黃。連。爲。若。佐。官。桂。少。許。使。心。

腎。交。於。頃。刻。鎮。肝。涼。血。煎。治。血。防。風。爲。上。使。黃。調。胃。

連。爲。中。使。地。榆。爲。下。使。調。胃。

厚臍益膽止驚癇瀉心除痞滿去婦人陰戶作腫愈
小兒食土成疳消惡瘡惡癰神濕熱鬱熱○又種生
羌胡國土因以**胡**爲名乾如楊柳枯枝折斷一
線煙出氣平寒味尤苦甚心內黑皮畧淡黃惡玄參
菊花亦解已毒忌猪肉悞食令人洩精癰癰熱骨蒸
治傷寒欬嗽溫瘧多熱卽解久痢成疳竟除補肝膽
却目痛尤靈理腰腎欬陰汗最捷小兒盜汗潮熱婦
入胎蒸虛驚並宜用之不可缺也

漢按苦先入心火必就燥黃連苦燥乃入心經雖
云瀉心實瀉脾臟爲子能令母實實則瀉其子也
但久服之反從火化愈覺發熱不知有寒故其功

効惟初病氣實熱盛者服之最良而又病氣虛發熱服之又反助其火也

桔梗

味辛苦氣微溫味厚氣輕陽中陰也有小毒

山藟雖盛近道亦多。交秋分後採根。噬味苦者入藥。蘆苗去淨。泔漬。洗米泔焙乾。入手足肺膽二經。畏白及。龍眼。龍膽。開胸膈。除上氣壅。清頭目。散表寒邪。毆脇下刺疼。通鼻中窒塞。咽喉腫痛。急覓中惡蠱毒。當求。逐肺熱。住欬下痰。治肺癰。排膿養血。仍消悲怒。尤卻怔忡。又與國老。並行。同爲升楫之劑。載諸藥。不致下墜。引將軍。欬可使上升。鮮利小兒驚癇。開提男子血氣。○**別種**味甘氣寒。在處山谷。生樹與桔

梗似根甚甘美可亂人參土人取蒸壓匾以克人參
賣者即此是也善解諸毒別無所能蛇蟲毒搗敷藥
石毒生服以毒藥與之共服其毒氣自旋消無野猪
被毒箭中傷亦每食此物得出

積毒

味苦其氣寒味厚氣薄屬土有承陰也無毒

春生山野僻處苗係藤蔓引長葉作叉有毛以對花

淺黃六瓣以謂花實結拳大青漸赤黃皮黃蒂小正圓

者名謂皮赤蒂麗銳長者名謂名傳雖異證治相同

霜降採收團圓搗爛或煨蛤蜊粉和舊紫口者嚴研

半或研明礬末攪明礬四兩各以新瓦貯盛置於風

日處所待甚乾燥復研細霜明礬者號如聖丹用薑

汁打糊丸就

出生薑湯吞下蛤蜊者勝真海粉可多備

聽用一年

出諸證並主痰喘欬嗽服下神効立獲取

剥殼

用仁滲油

重細包裹只一度免人惡心母多

傳壓滲之

次失藥潤性畏牛膝乾漆及附子烏頭惡乾薑使拘

杞味其補肺捷性潤下氣佳令垢滌鬱開故傷寒結

胸必用俾火彌痰降凡虛怯癆嗽當求鮮消渴生津

悅皮膚去皺下乳汁炒香酒調末服

取仁炒香熟為末酒調一匕覆

面脂止諸血並炒入藥煎湯

一切血證並治

聖藥搗汁濃煎

中弱諸傷暑服効○又

天

即枯樓根挖深土者

曝乾刮龜皮淨咀片善潤心中枯渴大降膈上熱痰

腫毒排膿潰瘍長肉消撲損瘀血除時疾熱狂毆酒

痘去身面黃通月水止小便利仍治偏疽酒浸微煎
如法服之住痛如劫先以綿袋包煖陰囊取天花粉五錢以醇酒一碗早晨清至下午微煎滾於天空下露通一宿次早低燒坐定燙手按膝軟下脚如未効再服一劑造勝調
粥日食亦潤枯燥補虛

貝母

味辛苦氣平微寒無毒荊襄多生苗莖青色葉

如大麥葉花類鼓子花近冬採根曝乾聽用有瓣如
聚貝子故人以貝母名黃白輕鬆者為良油黑重硬
者勿用去心咀片入肺行經消膈上稠痰久欬嗽者
立効散心中逆氣多熱鬱者殊功仲景治寒實結胸
製小陷胸湯以栝樓子黃連輔斯作主因味辛散苦
今方改用海葎療產後無乳立三母散用牡蠣知母
半夏候也

尊此爲君。錢補蹄足生人面惡瘡。燒灰油敷收口。產
難胞衣不出。研末酒服離懷。時疾黃疸能毆赤眼。膚
腎堪點。除疔瘕喉痺。止消渴熱煩。○又**升龍膽**係獨
顆。雖無分折。儻慢煎服。令遍身筋不收持。藍汁黃精
合飲即解。

謹按世俗多以半夏有毒棄而不用。每取貝母代
之。殊不知貝母乃太陰肺經之藥。半夏乃太陰脾
陽明胃經之藥。何得而相代耶。且夫欬嗽吐痰。虛
勞吐血咯血。痰中見血。咽痛喉閉。肺癰肺痿。婦人
乳難癰疽。及諸鬱證。此皆貝母爲向导也。半夏乃
爲禁用。若涎者。脾之液也。美味膏粱炙博太料。皆

生脾胃濕熱故涎化稠粘爲痰久則生火痰火壅
攻故令昏愒不省人事口噤偏廢僵仆蹇澁不語
生死旦夕自非半夏南星烏可治乎若以貝母代
之則束手待斃矣

款冬花

味辛甘氣溫陽也無毒生常山縣名屬山山谷

及上黨註水傍葉大成叢似葵花出根下如菊百草

中惟此不顧冰雪最先春者也原呼鑽凍今名款冬

擇未舒嫩莖採收去向外裹花零殼甘草湯浸一宿

待乾搗碎綿裹惡硝石皂莢玄參畏麻黃辛夷貝母

仍畏四味苓連耆耆黃耆黃連黃連使杏仁宜紫苑治肺

癰膿血腥臭止肺欬痰唾稠粘潤肺瀉火邪下氣定

喘促卻心虛驚悸去邪熱驚癇補劣除煩洗肝明目
又毆久嗽燒煙吸之

紫菀

味苦辛氣溫無毒近道多生真定

郡名屬北直隸獨勝

根甚柔細春初採收水洗淨去頭蜜浸宿焙用忌靈
丸遠志惡瞿麥天雄畏茵陳蒿使款冬葦主欬逆痰
喘肺痿吐膿治小兒驚癇寒熱結氣虛勞不足能
蠱毒痿瘳堪毆仍佐百部款冬研末薑梅湯下共治
久嗽立建神功款冬葦各一兩百部五錢為末每服
錢生薑為梅湯送下食後及臨卧
一名白菀
惟畏鹵鹹紫苑缺時用此可代亦主驚癇寒熱氣喘
又止霍亂為痢腸鳴除肺傷欬勤去膀胱支滿

馬兜鈴

味苦。氣寒。陰中之陽。無毒。山谷俱有。野坂尤多。藤蔓繞樹而生。結實如鈴。五瓣。去革膜。取肉裏。鹽子。入藥。劑微炒。燥爲良。燒煙熏痔。瘻。鹽落煎湯。劫痰結喘促。去肺熱。止欬。清肺氣。補虛。○根名**黃連**。亦爲散氣藥。

木香

味甘苦。氣溫。味厚於氣。降也。陰中陽也。無毒。出自外蕃。來從閩廣。形如粘骨。苦口粘牙。凡欲用之。勿見火日。合丸散。日際熏乾。煎熟湯。臨服投末。氣劣氣不足。能補氣。脹氣窒塞。能通。和胃氣。如神。行肝氣。最捷。散滯氣於肺上膈。破結氣於中下焦。絞九種心疼。逐積年冷氣。藥之佐使。亦各不同。破氣使檳榔。和胃

佐薑橘止霍亂吐瀉嘔逆翻胃除痞癰癥塊臍腹脹
疼安胎健脾誅癰散毒和黃連治暴痢用火煨實大
腦辟瘟疫邪禦霧露瘴易老云總謂調氣之劑不宜
久久服之

按王海藏謂本經云主氣劣氣不足藥性論謂
安胎健脾是皆補也衍義謂瀉胃腹壅塞積年冷
氣日華子謂除痞癰癥塊是皆破也易老總謂調
氣之劑不言補不言破諸說不同何耶恐與補藥
爲佐則補與瀉藥爲佐則瀉故云然也

大茴香

子味辛氣平無毒鄉落多生秋月方採設有

八角子赤藏中嚼甚香甜鹽酒炒用入心腎二臟及

小腸膀胱主腎勞疝氣小腸吊氣攣疼理乾濕脚氣
膀胱冷氣腫痛開胃止嘔下食調饌止臭生香為諸
痿霍亂捷方補命門不足要藥療惡腫癰毒搗根葉
汁吞○又**香**家園栽種類蛇床子色褐輕虛亦
治疝散疼每同煎取効飲饌大料增入尤奇○別種
特羅出自閩廣顆粒似蔓椒開口俗呼特羅嫩肉有黑子但皮薄色褐
不紅氣味比茴香更辛散氣除脇肋膨調饌殺魚肉
毒消食開胃溫中健脾

香

即草味苦甘氣微寒氣厚於味陽中陰也無毒

近道郊野俱生高州

嶺南

出者獨勝狀如棗核周匝

有毛秋取曝乾忌犯鐵器預春熟童便浸透復搗碎

砂鍋炒成。若理氣疼。醋炒尤妙。乃血中氣藥。凡諸血氣方中。所必用者也。快氣開鬱。逐瘀調經。除皮膚癢。瘰癧外邪。止霍亂吐逆。內證炒黑色。禁崩漏下血。調醋末敷乳腫。咸離宿食。可消泄瀉。能固。歐熱長毛髮。益氣克皮毛。又服利人。陳利亦當解悟。又引血藥至氣分而生血。故因而稱曰婦人愛藥也。

謨按本經諸方。用逐瘀血調經。是下氣而推陳也。用治崩漏不止。是益氣而止血也。又云引血藥至氣分而生血。是又能補何如。言相背。爰用相矛盾耶。雖然是亦陰生陽長之義爾。但本經未嘗言補。惟下老湯用之。言于老人有益。意有存焉。蓋于行。

中煎有補。補中兼有行。正如天之所以爲天者。健而有常也。健運不息。所以生生無窮。即此理也。

益智

味辛。氣溫。無毒。嶺南州郡歲歲有生。去殼取仁。研碎入藥。主君相三火。入脾肺腎經。在四君子則入脾。在集香丸則入肺。在鳳髓膏則入腎。三經而互用者。蓋有子母相關意焉。和中氣。及脾胃寒邪。禁遺精。併小便遺溺。止嘔噦。而攝涎唾。調諸氣。以安三焦。更治夜多小便。入鹽煎服。立効。

縮砂

味辛苦。氣溫。無毒。產波斯國中。及嶺南山澤

苗高三四尺許。

葉面長

葉有八九寸長。

半開花近

根嬌婉。結實成穗。連綴皮緊厚多。歛色微赤黃。子八

漏一團粒如黍米故名縮砂蜜也。秋採陰乾精製如
式。先和皮慢火炒熟。纔去殼取仁研煎。與益智子入
參爲使入脾。與白檀香、荳蔻爲使入肺。黃蘗、茯苓爲
使入膀胱。腎赤白石脂爲使入大小腸。除霍亂止惡
心。卻腹痛安胎。溫脾胃下氣。治虛勞冷瀉。併宿食不
消。止赤白洩痢。及休息痢。證總因通行結滯。服之悉
應如神。起酒味甚香。調食饌亦妙。

葶藶

味辛氣溫升也。陽也。無毒。惟生閩廣。八月採收。
內子大粒成團。外殼緊厚黑皺。凡資入劑。取子剉成。
氣每熏人。因最辛烈。夏月造生魚鱸亦多用此釀成。
故食饌大料方中。必使以爲君也。消宿食立除脹滿。

去邪氣且卻冷疼同縮砂溫中焦佐常山截疫癘辟
山嵐瘴氣止霍亂惡心

謨按草菓本經原未載名今考万書補其遺缺但
性辛烈過甚凡合諸藥同煎氣獨熏鼻則可知矣
雖專消導大耗元陽老弱虛羸切宜戒也

肉豆蔻

味苦辛氣溫無毒胡國多生嶺南亦產一名
肉菓形類彈丸油色肥實佳麵包煨熟用所入經絡
惟手陽明療心腹脹疼卒成霍亂者可止理脾胃虛
冷不消宿食者能溫男婦傷暑血痢有功小兒傷乳
吐瀉立効痢疾助之白粥飲吐瀉佐以生薑湯

白豆蔻

味辛氣大溫味薄氣原陽也無毒原出外蕃

今生兩廣苗類芭蕉最長葉如杜若不凋開花淺黃
結子作朶生青熟白七月採收入手太陰肺經別有
清高之氣散胃中冷滯益膈上元陽溫脾土卻疼退
目雲去障止翻胃嘔消積食腦

草豆蔻

味辛氣溫陽也無毒交趾國名多生嶺南亦有

苗類杜若梗根似高良薑花作穗嫩葉卷之而生葉
漸舒花漸出如芙蓉淡紅實結苞至秋成殼而熟秋
方老殼方黃似龍眼微銳外皮有稜如稜無鱗甲中
子連綴亦似白豆甚辛香應時採收曝乾收貯入劑
剥殼取子行經惟胃與脾去膈下寒止霍亂吐逆歐
臍上痛逐客忤和傷酒毒尤消口臭即解

謨按草豆蔻用治中脘冷疼鮮有得其真者市家多以草仁假代安獲奇功考究圖經著明形色俾後醫士過目即知匪但可取効病人抑亦不致欺於膏者也



味辛甘氣微溫味薄氣厚可升可降陽也無毒

嶺南郡州人多種蒔七月收採氣甚芬香市家多攬綿花葉茄葉假充不可不細擇爾揀去枝梗入劑專治脾肺二經加烏藥順氣散中奏功于肺加黃耆四君子湯內取効在脾入傷寒方名正氣散理霍亂俾嘔吐止開胃口令飲食增禁口臭難聞消風水延腫



味辛苦氣大溫純陽無毒高良係廣屬郡今

誌改名高州薑乃地土所生形多細小而緊健脾胃消食下氣溫中除胃間冷逆衝心卻霍亂轉筋瀉痢翻胃嘔食可止腹痛積冷堪毆○結實秋收名**紅豆蔻**善解酒毒餘治同前

胡椒

味辛氣大溫屬火有金無毒來從南廣出自西戎蔓生苗莖軟柔長僅寸半延發枝條細嫩與葉相齊子結條中兩兩相對其葉晨開暮合合則將子聚藏陰氣不沾故甚辛熱狀如鼠李六月採收番人呼爲昧履支中國稱曰胡椒子殺一切魚肉蠶鼈之毒調諸般食饌湯飲之需下氣去風痰溫中止霍亂腸胃冷痢可卻心腹冷痛堪除療產後血氣刺疼治跌

撲血滯腫痛食勿過劑損肺傷脾○又**蔓藤茄**柄麓
蒂圓係嫩胡椒青時摘取一云向陽生者爲胡椒向
陰生者爲澄茄化穀食理逆氣多効消痰癖止嘔噦
殊功染鬢髮香身逐鬼氣除脹傷寒欬噫亦每用之
○**烏鰂魚**所在俱生顏色烏顆粒畧大止痛破滯俗
用亦靈

防風

味甘辛氣溫升也陽也無毒種生沙苑屬河根

類蜀葵秋後採收曝乾入藥殺烏頭大毒惡藜欬羌

薑羌花白薑擇堅實脂潤爲良去蘆頭欬股不用係

太陽本經之藥又通行脾胃二經職居卒伍卑賤之

流聽命即行隨引竟至盡治一身之痛而爲風藥中

之潤劑也。治風通用。散濕亦宜。**身**去身半已上。風邪。**頭**去身半已下。風疾。收滯氣面頰。尤瀉肺實有餘。眩暈頭顱。更開目盲無見。故云除上焦風邪要藥。儻或誤服。反瀉人上焦元氣。爲害豈淺淺哉。**通**止痛骨節間。亦治風効。**通**消穀胃脘內。又調食香。**通**收採煎湯主風熱汗出。

防己

味辛苦。氣平寒。陰也。無毒。多生漢中府。屬陝通。

行十二經。畏草薢。殺毒雄黃。惡細辛。官使殷孽。狀與木通近似。氣吹亦貫兩頭。賣家因難得真。多採似者。假代。殊不知氣味大異。無益有傷。凡覓拯疴。甚宜細審。種因根苗各治。名分漢木兩呼。**漢防己**是根破之。

紋作車輻解黃實馨香是苗皮皺上有丁足
子青白麤軟宗此辯認庶不差訛並刮淨麤皮纔咀
成薄片漢者主水氣名載君行指木者理風邪職食
使列故去腰已下至足濕熱腫痛脚氣及利大小二
便退膀胱積熱消癰散腫非用漢者不能成功若療
肺氣喘嗽膈間支滿併除中風掣急風寒濕癰熱邪
此又全仗木者以取効也

謨按東垣云防已性苦寒純陰能瀉血中濕熱通
血中滯塞補陰泄陽助秋冬瀉春夏之藥也併諸
於大則險而健者類之夫險健者每每幸災樂禍
遇有風塵之警必竟偕爲亂階然而見善可喜見

惡亦怒如革用之可使禦敵克暴之人衝突險固之地亦不爲無益者也故凡瞑眩之藥聖人安得因之而便廢耶亦必存之以待善用今夫防已聞其臭則可惡下咽則令身心煩亂飲食減少藥之瞑眩誠爲撓屈至於通行十二經以去濕熱壅塞腫疼及治下注脚氣除膀胱積熱而底其基則非此不可誠爲行經之僊藥也然雖藥力之能亦在人善用而不錯爾復有不可用者數端今悉舉陳使知警省如飲食勞倦陰虛內熱元氣穀氣已虧之病而以防已瀉去大便秘則重亡其血此不可用一也如人大渴引飲是熱在下焦氣分宜參湯之

其防已乃下焦血藥此不可用二也如外感風寒邪傳肺經氣分濕熱而小便黃赤甚至不通此上焦氣病禁用血藥此不可用三也若人久病津液不行上焦虛渴宜補以人參葛根之甘溫儻用苦寒之劑則促危亡此不可用四也仍不止如此但上焦濕熱者皆不可用若係下焦濕熱流入十二經以致二陰不通必須審用可也學者宜併覽之

紫蘇

味辛氣微溫無毒各園圖俱栽葉背面並紫氣味香竄者甚美五月初五日採乾發表解肌療傷風寒甚捷開胃下食治作脹滿易差脚氣蕪除口臭亦辟**瘟**下諸氣畧緩體稍虛者用宜**研**破煖降氣定

喘潤心肝止逆消五膈破癥堅利大小一便卻霍亂嘔吐

制

味辛苦氣溫氣味俱薄浮而升陽也無毒山谷生。在處有。作蘇香氣。又名假蘇。夏末採收。陰乾待用。須取花實成穗。能清頭目。上行發表。汗解利諸邪。通血脈。傳送五臟。下瘀血。除濕痺。破結聚。散瘡瘍。搗和醋。敷風腫。疔瘡。研調酒。理中風。強直。仍治產後血暈。杵末攪入童便。

自注

味辛氣溫氣味俱輕升也陽也無毒所在俱生吳地尤盛氣甚香竄又名芳香根收處暑蛙無是日不色選黃澤効速惡旋覆使當歸通行手足陽明二

經又爲手太陰經之引使也乃本經頭痛中風寒熱
鮮利之要藥亦女人漏下赤白血閉陰腫之慝州
黑作面脂去面癥散目癢止目淚去肺經風寒治風
通用療心腹血痛止痛多宜外散乳癰背疽內托腸
風痔瘻排膿消毒長肉生肌一切瘡瘍並用調治與
細辛辛夷作料治久患鼻塞如神○葉名青道家
常採煎湯浴體能殺尸蟲

細辛

味大辛氣溫氣厚於味升也陽也無毒山澤多

產葉陰

燦

略

屬

獨良

葉類馬蹄

莖如麥葉其根甚細

其味甚辛藥中惟採根煎故因名曰細辛也賣者多
以杜蘅假代誤不知氣雖小異入口吐人不可不細

擇耳。反藜蘆忌。生萊畏滑石。硝石惡狼棗。狼棗毒山黃

耆。鮮手少陰引經。乃足少陰本藥。或用獨滑為使。或

佐曾青。黃根止本經頭痛如神。治諸風濕痺立効。安

五臟。尤益肝膽。溫陰經。旋去內寒。利竅通精。清痰下

氣。得歸為牡。本芎芷甘草。當歸芍藥牡用皮。藜蘆婦

人血閉神方。得決明魚膽羊肝。石決明青囊止風淚

目疼。却劑寒邪。發在裏之表。合麻附三味煎湯。附子

細辛湯載口集及墜齒腫疼。黃濃汁熱含。冷吐過半

錢車服。令氣塞命傾。

麻黃

味甘辛。氣溫。氣味俱薄。輕清而浮。升也。陽也。無

毒。青州彭城並屬俱生。柴陽中牟。並屬獨勝。惡心胃。子

石葦宜陳久年深。凡欲用之須依法製。去根如單葉
數沸。傾上沫。用火焙乾。任合丸散煎湯。方不令人煩
悶。以厚朴爲使。入手足四經。手太陰經本經之藥。陽
明經榮衛之藥。而又入足太陽經。手少陰經也。發汗
解表。治冬月正傷寒如神。毆風散邪。理春初真溫疫
果勝。泄衛實消黑斑赤疹。去寒除身熱。頭疼春末
溫瘧勿加。夏秋寒疫切禁。因時已變溫熱難抵劑之
輕揚。仍破積聚癥堅。更却欬逆痿痺。山嵐瘴氣亦可
禦之。若蜜炒煎湯。主小兒瘡疱。患者多服。恐致亡陽
止汗固虛。最效。

謹按東垣云。麻黃治衛實。桂枝治衛虛。雖俱治太

陽之經其實柴衛藥也肺主衛心主榮麻黃爲手
太陰之劑桂枝爲手少陰之劑故冬月傷寒傷風
欬嗽者用麻黃桂枝即湯液之源也然麻黃又爲
在地之陰陰當下行何謂發汗而升上經云味之
薄者陰中之陽麻黃屬陰氣味俱薄薄則陰中有
陽可知矣安得不爲輕揚之劑升上而發汗乎但
入手太陰經終亦不能離乎陰之本體也

黃芩 味苦氣平寒氣味俱薄體輕上行浮而微降陽
中陰也無毒各山谷俱生成藤蔓旋長春切發葉秋
後採根入土深者力洪去皮用之効速殺野葛已立
百毒入胃足陽明行經療傷寒發表解肌治_標上

津止渴解酒毒卒中卻溫塵往來散外瘡疹止火熱
中胃氣除熱花消酒不醉花治痢實腫花萬大
寒專理天行時病止熱毒吐衄去熱燥渴消婦人熱
悶能甦小兒熱痞堪卻花其冷醉後宜餐除煩熱
利大小便壓丹石解鴆鳥毒花敷金瘡搗爛花祛喉
痺燒灰

葦蘆

味苦氣溫可升可降陰中陽也無毒隨處平

澤俱有。不聞水聲者良。先於衆草而生。莖方數葉相
對。花開淺碧。根甚密稠。冬月採根陰乾。日選丙丁戊
巳去蘆酒洗。忌茗麵湯。消膈中久積痰涎。除腹內痞
疳。氣。散瓜。青風中。癢痛。利腰膝。胠。髀濕。參。冬。

疼蓋性好走。能通行十二經。爲諸風濕冷痛要藥。仍毆癥瘕。尤療折傷。虛者切禁用之。多服踈人真氣。**秦艽** 味苦辛。氣平微溫。可升可降。陰中陽也。無毒。出甘松龍洞及河陝諸州。長大黃白色爲優。新好羅紋者尤妙。用菖蒲爲使。入大腸手經。養血榮筋。除風疽。肢節俱痛。通便利水。散黃疸。遍體如金。誅頭風。解酒毒。止腸風下血。去骨蒸傳尸。

秦艽 味辛苦。氣溫。氣厚。味薄。升也。陽也。無毒。多產河東。亦生杭郡。春採根。曝三十日。成。因其根上苗下狀。與禾藥相同。故以藥本爲名。爾惡蘭茹。畏青箱。氣力壯雄。風濕通用。止頭痛。顛頂上。散寒邪。巨陽經得自

芷作面脂同木香辟露露○實以**鬼**為譽上風

入四肢

雞蘇

味辛苦氣溫氣味俱薄浮而升陽也無毒又名

雞蘇各處俱種姑蘇龍腦者第一

龍腦地名在蘇州

者氣甚香竇因而得名古方有龍腦雞蘇丸此是也

五月端午日採乾與薤

作痘相宜和蜜炒饒益効入手厥陰包絡及手太陰

肺經下氣令脹滿消彌發汗俾關節通利清六陽會

首敗諸熱生風退骨蒸解勞乏善引藥入榮衛乃因

性喜上升小兒風涎尤為要藥新病瘥者忌服恐致

脫汗亡陽猶慎食之即時昏醉蓋亦物相感爾

氣微

無毒三伏堪為菜蔬兩京亦每栽

入藥拯病。隨房可收。大葉者種優。陳年者効捷。霍亂中腕絞痛。治傷暑小便澀難。散水腫。有徹上徹下之功。肺得之清化行熱自下也。去口臭。有撥濁回清之妙。脾得之鬱火降。氣不上焉。解熱除煩。調中溫胃。○又有一種名曰香薷。近生臨水附崖。葉細辛香。彌甚。今多採此。拯治亦佳。



味甘。氣平。無毒。泰山山谷多生。滁州舒州俱有。葉長而狹。表白裏青。莖幹黃精相同。強直似竹。有節。故一名玉竹。又名地節。咸取象也。根大如指。一二尺長。色黃多鬚。其美可啖。開青花。春末結圓實。夏初入劑。採根竹刀刮淨。蜜水浸宿。文火烘乾。勿誤取。

鈎吻黃精

二物俱似萎蕤但萎蕤節上有須仔細辨

認真假考古方多用畏鹵鹹勿加益氣補中潤肺除

熱主心腹結氣更熱濕毒治腰脚冷痛天行熱狂止

皆爛雙眸逐風淫四末澤容顏去面黑黥調氣血令

體康強○又種黃精辛溫氣味與萎蕤全別似白欬

蔓生開白花結細子在荊張每名曰蔓地楚今人常

謬以爲白頭翁採得陰乾去頭上白莖剉成細片拌

豆淋酒蒸從巳至申方取曝用主霍亂腸鳴洩痢瀝

浙風寒理遊氣上下無常癰癰寒熱消食毆積出汗

散邪

按萎蕤本經以女萎同條考其諸註有指一

二名有謂自是一物。又後女萎與前女萎同名。亦云功用並同。信非二物。疑乃剩出一條也。但考陳氏所註。謂古方用者。又似差殊。胡洽治時氣洞下。蟹下。有女萎丸。治傷寒冷下。結腸丸。亦用女萎。治虛勞。小黃耆酒。云下痢者。加女萎。詳此數方所用。乃後加。因女萎緣其性溫。主霍亂洩痢故也。又茵芋酒。用女萎。主賊風手足枯痺。四肢拘攣。女萎膏。治身體癢斑。剥乃似前。與萎蕤同條。女萎緣其主風淫四末。及去黑黥。澤容顏故也。葢器亦謂更非二物。是不然。況此女萎性平味甘。後條女萎性溫味辛。性味既殊。功用又別。安得爲一物乎。又續命

驚甲湯治傷寒七八日不解驚甲湯治脚弱並周
萎蕤又萎蕤飲主風熱項急痛四肢骨肉煩熱萎
蕤丸主風虛熱發即頭痛乃似前與女萎同條萎
蕤緣其主虛熱濕毒故也三者主治既殊則非一
物明矣又云萎蕤一名地節極似偏精疑即青黏
甘草佗所服漆葉青黏散是此也然世無復能辯
者未敢爲信姑著之以俟明達折衷爾

白耳實

味苦甘氣溫葉苦辛微寒有小毒本生蜀川

今發各處一名蒼耳實小刺多羊過即粘綴毛中故
又名之曰羊負來也秋採微炒入藥最忌猪肉米泔
散疥癬細瘡遍身瘙癢者立効敗風濕周痺四肢

急者殊功止頭痛善通頂門追風毒任在骨髓設
蟲濕墜主惡肉死肌益氣開聰明強志煖腰膝亦堪
久服明目輕身**根**逢端午收藏辟惡入病家無畏
汁攪小便同飲去疔腫如神授安舌下流涎治目黃
好睡若被犬咬急服彌佳痔發肛門煎湯熏妙

天門冬

味甘辛氣寒無毒各處江湖俱生平原川澤

尤盛與蘼荷同狀逢夏秋抽條花開紫白相兼葉似
菰菜而小本經別款地菰即此是也五月採曝一種
數名辛味似薑有麥句薑之號香氣如蘭有蟾蜍蘭
之稱仍謂蝦蟆藍因藍狀頗類又呼天蔓菁爲蔓菁
畧同別說載名天門精爾雅載名蒟蒻豕苢昔劉瓛

曾拔塞刮麀而蹶起古劉燼射一麀刮除臍腑拔此草塞腹內麀蹶而起燼怪而去此三變如後世復相傳云活鹿草亦曰劉燼草名之疊出如許之多苟弗考詳寧無疑惑單用垣衣爲使專療折傷金瘡拔腫毒惡疔下瘀血血瘕利小便以逐積水除結熱而止渴煩追小蟲去濕痺亦堪久服耐老輕身

謨按一種數名者甚多名各有因者誠少此名疊出咸載所因但既稱活麀之功當亦著濟人之効歷考古傳方劑並無用之各省明醫絕無識者有用之藥不得濟用當時徒列多名正所謂雖多亦奚以爲也

防葵

味甘辛苦氣寒無毒一云有小毒不生他州性

產襄陽屬湖廣一本三莖一莖三葉中抽大幹花開幹

端幹色白如蕒葉類葵葉色青根若防風香竄故因名

防葵也三月三日採根曝乾最易乾依時入水能

浮切勿誤用狼毒二根形類水畧少異耳善惡大差用

慎謹藥劑修合製法須知甘草湯浸成塊一宵黃精

汁拌咀片炒燥主膀胱熱結尿溺不通治鬼瘡癰瘤

驚邪狂走疝瘕腸洩堪理小腹支滿能毆強志除腎

邪益氣堅筋骨血氣瘤大如碗摩醋塗上即消中火

者不可服之令恍惚如見鬼狀

蛇床子

味苦辛甘氣平無毒在處田野俱產楊州襄

州獨良春發苗葉成叢青碎彷彿蒿扶開白花細綴
百餘一窠四五開結黃子輕虛粒如黍米近秋收採背
日陰乾所惡之藥有三牡用巴豆貝母入藥取仁炒
用浴湯帶殼生煎治婦人陰戶腫疼溫煖子臟療男
子陰囊濕癢堅舉尿莖歛陰汗卻癰癩掃瘡瘍利關
節主腰膝腫痛祛手足痺頑大風身癢難當作湯洗
愈產後陰脫不起縮袋熨收婦人無娘最宜久服

草龍膽

味苦澁氣大寒氣味俱輕陰也無毒山野俱
有苗高尺餘葉類龍葵畧尖根同牛膝甚苦故因名
草龍膽也須近冬月方採其根甘草湯浸一宵漉出
曝乾待用伏貫衆爲使惡防葵地黃止洩痢去月

小蟲卻驚癰益肝膽二氣胃中伏熱及時行溫熱能
除下焦濕腫併酒疸黃腫堪退療客忤疰氣治癰腫
口瘡敵驚癰殺蠱毒酒浸爲柴胡輔佐上行治眼目
赤疼努肉必加醫障通用空腹勿服令人溺遺

澤瀉

味甘酸氣寒氣味俱厚沉而降陰也陰中微陽

無毒淮北雖生不堪入藥漢中所出方可拯疴蓋因
形大而長尾有兩岐爲異耳但易蛀朽須密收藏製
宗雷公酒浸曝用畏海蛤文蛤二藥入太陽少陽足
經君五苓散中因其功長於行濕佐八味丸內引桂
附等歸就腎經去陰汗大利小便瀉伏水微養新水
故經云除濕止渴聖藥通淋利水仙丹久服輕身多

服昏目。**藥**壯水臟通血脈行乳汁催生。**實**主風痺除濕邪強陰氣益腎。服久無子。惟面生光。

謨按澤瀉多服雖則昏目。暴服亦能明目。其義何也。蓋味鹹能瀉伏水。則胞中留久陳積之物由之而去也。瀉伏水去留垢。故明目。小便利。腎氣虛。故昏目。二者不可不知。

瞿麥 味苦辛。氣寒。降也。陽中微陰。無毒。生泰山川谷。今處處有之。結實與麥同形。故因名曰瞿麥。立秋收。採風際陰乾。惡蜈蚣。使藜蘆。其藥利小便。君主可用。決癰腫。佐使堪爲。去目瞤。逐胎。下閉血。出刺。

補

味甘淡。氣平。味薄。降也。陽也。陽中陰也。無毒。產

江淮山谷如指大藤莖正月採收陰乾入藥因孔節相貫吹口氣即通故此得名去皮咀片瀉小腸火鬱不散非他藥可倫利膀胱水閉不行與琥珀相等消癰疽作腫療脾疸嗜眠解煩噦開耳聾出音聲通鼻塞行經下乳催產墮胎**靈結**如小木瓜名曰鷲腹白樨亦能治翻胃證除熱三焦**根**治項下瘰癧多取絞汁頓服○又種心空有瓠與燈草同乃**通腸木**立名憑樣碎用潔白輕塵可愛女工每剪飾花利水使陰竅通和退腫令癰閉舒泰更治產後下乳如神

謨按通草通脫木經云行水專利小腸且多他證之治既為良藥當勿傳訛奈何時醫每以通草認

作別條木通以通脫木反呼名曰通草致使市家
真偽混賣誤人甚多殊不知本草立名各有意寓
通脫木因瓠中藏脫木得之名竟直述通草藤莖
不甚長大故以草稱木通係俗指葡萄藤莖且大
且長特加木字總曰通者孔竅悉同行水利腸固
並建効其治他證雖百木通不能及一通草矣齊
驅並駕安得謂乎况木通栽多家園皮薄堅確實
名葡萄通草產自山谷皮厚軟柔實名驚腹通脫
木輕虛繁白皮木脫除三者內似外殊極易分別
名正言順何得悖遠只緣堅信耳聞不復詳考經
意錯亂顛倒莫覺其非醫誤猶開病悞深可憫也

之參

味苦鹹氣微寒無毒春生深谷莖方葉似芝蔴

柳細長秋取傍根正根初白乾旋紫黑鼻聞微臭咀

片忌銅誤犯餌之噎喉喪目古人深戒吳戴醫通

氏醫惡者棗姜茱黃耆大棗反藜蘆一味可為君藥

惟走腎經強陰益精補腎明目治傷寒身熱支滿忽

忽如不知人療溫瘧寒熱往來灑灑時常發顫除女

人產乳餘疾歐男子骨蒸傳尸逐勝內血瘕堅癥散

頸下痰核癰腫蓋此乃樞機之劑管領諸氣上下肅

清而不致濁治空中氤氲之氣散無根浮遊之火惟

此為最也

之參

味苦甘氣微寒魚毒江淮俱多宛句龍尤妙叢

生崖壁上。苗高二尺餘。葉類枸杞。有叉枒。根若葵根。而筋大。近夏花開白色。瓣瓣有白粘膠。圖經嘗云。此為小異。秋後採根曝用。中正白實者佳。反藜蘆惡。防已乃足厥陰本經藥也。治諸毒。排膿消腫。安五臟。益肺補肝。止疝氣絞疼。散浮風癰瘰。除邪熱。去驚煩。易老用代人參。形實不同。蓋取味之苦甘。馮中燕補各相類爾。

別參

味苦。氣微寒。無毒。山谷有。在處多。莖方稜。長尺

餘。青色。葉相對似菱荷。有毛。花紅紫。夏開。根籠長冬採。畏寒水。蛇反藜蘆。專調經脉。勻善理骨節痛。生新血去惡血。落死胎。安生胎。破積聚癥堅。止血崩帶下。

脚痺軟能健眼赤腫可消散癰贅惡瘡非膿生肉辟
精魅鬼崇養正毆邪更治腸鳴幽幽滾下如走水狀
青葙子 味苦氣平微寒無毒園圃俱有江淮獨多莖
直似蒿青紅葉大如柳柔軟花上紅下白形類鷄冠
即野雞冠花子黑匾而光粒同莧實六月收取多治
細白者勝眼科去肝臟熱毒上衝青盲腎腫除心經火邪暴發
赤障昏花堅筋骨鎮肝益腦髓聰耳亦妙春採
陰乾治風熱癢癢於皮膚療疥痔蟲墜於下部止金
瘡去血塞鼻衄來紅

謨按本經歟內載曰子名草決明意謂功專治眼
特假別名以美之非真為決明子也若以為然則

原揭諸簡端何不直書而但曰青葙子乎正猶沙
參一名知母龍眼一名益智名同而實異也且別
條所載決明子藥粒狀稍大主治尤優世醫弗明
或偏執一不免得此失彼大辜藥味之能矣幸而
此曰草決明彼曰決明子兩名雖一上下字差畧
此分別不同讀者不可不識也

木賊

味甘微苦無毒苗長尺餘寸寸有節產自秦隴
諸郡色青凌冬不凋夏將莖收手搯節淨憑煎湯液
任合散九益肝膽退目瞽暴生消積塊止月經久滴
極易發汗大能疎邪得麝香牛角鯁治休息痢證得
芎藭餘糧石治赤白崩中得桑耳槐槐療腸風下血

得槐子枳殼療痔瘻來紅

惡藥

即牛旁子

味辛苦氣平無毒原產鄧州屬河今生各處

葉如茵芋葉長大實似葡萄核褐黃殼類粟稗小而多刺鼠過之則綴惹不落故又名曰鼠粘子也秋後採取製宜酒蒸止牙齒齲疼散面目浮腫退風熱咽喉不利及腰膝風凝毆風濕癰瘡盈肌併瘡瘍毒盛生吞一粒即出瘡頭明目補中潤肺散氣

微衡

味苦氣平微寒無毒素問名曰麝衡南人謂之

吳風草也根莖赤黑花開淺黃葉叢生似莞藪有毛種兩般分大小各喚大者名大吳風草小者名小吳風草麋鹿有疾銜此草茹素問之名又因此出產漢

中川谷及宛句邛郫音秋採莖葉陰乾須得秦皮

爲使主風淫濕痺致歷節痠疼療吐瀉驚癇及鼠瘻
癰腫卻熱除痿蹙逐水消暴癰婦人服之絕產無子

誤按神農經中藥之靈者不計千白何獨麋御矢
醴並著素問擅名滑氏讀鈔亦嘗論及乃曰矢醴
麋銜治人疾也豈誠二藥果有過乎諸藥之能以
致喋喋贊美之如是耶蓋緣上古之前俗尚質朴
人所病者多中實邪二藥專攻正與病對用每輒
效故錄其名中古以來咸溺酒色病之著體虛損
居多藥宜補調難行攻擊由是鷄矢泔酒無復下
咽麋銜之名絕不聞耳正孟子所謂彼一時此一

時故也不然利前之藥豈有不利於後乎

敗醬

味苦鹹氣平微寒無毒俗呼苦蕒菜多生深谷中入劑用之夏初收採因似敗豆醬氣故以敗醬爲名入足少陰腎經及手厥陰包絡除腫癰排膿散血破癰結催產落胎去疽痔疥癢卻毒風瘡痺鼻洪吐血能止腹痛凝血可推

白薇

味苦鹹氣平大寒無毒近道處處俱生根類牛膝短小三月三日收經陰乾惡黃耆大黃乾薑及乾漆山茱大棗主中風身熱肢滿忽忽人事不知療濕痿寒熱痠疼洗洗有時發作狂惑鬼邪堪卻傷中淋瀝可除利氣益精下水滲濕

白前

味甘辛。氣微溫。無毒。出江浙蜀川。生洲渚砂磧。葉如柳樹葉。苗似芫花苗。根麓長。與牛膝頗同。但堅脆。韌而柔軟。鮮有凡質入藥。秋後採根。甘草湯浸一宵。折去蘖鬚。焙用。欬嗽上氣。能降胃。脇逆氣。堪毆氣壅。膈倒睡不得者。殊功。氣衝喉。呼吸欲絕者。立効。仍治氣塞咽隘。時作水雞聲。鳴。故古人氣嗽方中。每每用之不遺。亦以其善主一切氣也。又能保定肺氣。溫藥佐使尤奇。

誤按白薇白前。近道俱有。苗莖根葉。形色頗同。儻誤採收。殺人頃刻。必辯認的實。方入藥。拯疴。白前似牛膝。麓長。堅脆易斷。白薇似牛膝。短小。柔軟能

彎仍噬汁味相參庶不失於差悞此醫家大關鍵
匪特一藥爲然凡相類者俱不可不細察爾

白鮮

味苦鹹氣寒無毒山谷俱有苗莖尺餘嫩葉

粉白似槐葉尤繁花淡紫

四月開

如蜀葵畧小根與莖

菁彷彿心實皮色白黃二月採根取皮差晚則虛惡

也因鱖作羊羶氣息故俗加羊字呼名

俗呼爲白羊鮮惡拮

梗蝶蛸及茯苓草薺瘡遍身黃疸濕痺手足不能屈

伸治一切癩毒風瘡眉髮因而脫落消女人陰腫或

產後餘疼止小兒驚癇併淋瀝欬逆時熱發狂飲水

多多煎服尤宜葛洪治鼠瘻有膿熬白鮮皮膏吐出

立愈李其部理肺嗽不已製白鮮皮湯飲下即差

狗脊 味苦甘。氣平微溫。無毒。深谷多生。在處俱有。根採類金毛狗脊。故假爲名。酒蒸。須從巳至申。纔咀入劑。惡敗醬。使革解。治腰背強疼。開機緩急。理脚膝軟弱。筋骨損傷。女子傷中。欠調。老人失溺不節。周痺寒濕。並可醫痊。

菖蒲 味苦。氣微寒。微溫。無毒。苗如蒿艾。處處叢生。十月採實陰乾。荆實薏苡爲使。江南人家亦多種。此以辟蛇也。消食明目。益氣輕身。主女人經澁不通。扶男子陽痿不舉。消水氣。作脹。散瘀血。成癰。打撲折傷。風寒濕痺。腰膝重痛。骨節痠疼。多服獲効。全安。久服延年不老。

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

味苦辛，氣平微寒。陰中微陽，無毒。隨處俱產。

泰山者，良葉細青，蒿雖同，葉背白色，却異。秋後華落，莖梗不凋。至春復發舊枝，故因名茵陳蒿也。所行經絡，惟足太陽，專治疸症。發黃入劑，使爲君主。佐梔子、附子，分陽熱陰寒。陽黃熱多，有濕有燥，濕黃加梔子、大黃湯服。燥黃加梔子、橘皮湯煎。如茵澁則濕黃，苗旱則燥黃，濕則瀉之，燥則潤之意也。陰黃寒多，只有一證，須加附子，共劑成功。鮮傷寒大熱，仍除退瘴瘧，風熱悉逐，行滯止痛，寬膈化痰，久服輕身，益氣耐老。

宜青

即青

味苦，氣寒，無毒。山谷川澤隨處有生，葉實根

莖並堪入藥。春夏採用，莖葉爲宜。入童便熬膏，退骨

莖勞熟生搗爛絞汁卻心痛熱黃瘰肉腫癰燒灰淋
濃湯點洩痢鬼氣研末調米飲吞秋冬用之取根與
實實須炒過根乃咀成愈風癰疥瘡止虛煩盜汗開
胃明目辟邪殺蟲○**青蒿**即蓬蒿別名似青蒿而葉
鹿上有白毛
青蒿補中氣去濕黃長毛髮殊効○**青蒿**似青蒿細軟
利腸胃通血脉續不足有功○**青蒿**葉長齊頭一名齊頭
膏克皮膚血脉滿盛○**青蒿**花罷作角主口齒疳隱
惡瘡○**蘼蒿**比小蘼畧殊下氣破血○**蘼蒿**與黃菊
近似安心養脾○又**馬薊**類莧薊葉俗呼虎麻莧
薊亦理風濕癰瘍

謨按諺云三月茵陳四月薊人每誦之只疑兩藥

一種因分老嫩而異名也。殊不知葉雖近似，種却不同。草蒿葉背面俱青，且結花實。茵陳葉面青背白花，實全無。況遇寒冬，尤大差異。茵陳莖幹不凋，至春復舊幹上發葉，因幹陳老，故名茵陳。草蒿莖幹俱凋，至春再從根下起苗，如草重出，乃名草蒿。發舊幹者，三月可採；產新苗者，四月纔成。是指採從先後爲云，非以苗分老嫩爲說也。

狼

味甘，氣寒，無毒。曠野平原，無處不產。本爲蓋屋

草，俗呼過山龍。收採洗去衣皮，搗斷，忌犯鐵器。其美可啖，斷穀甚良。下淋利小便，通閉逐瘀血，除客熱，療腸胃止吐衄，因勞傷解渴，堅筋補中益氣。破血且

下水腫**疔**止血仍罾金瘡又有**茅筭**一名茅筭禁朋
漏塞鼻洪腫毒未潰服之一針便潰一孔**茅筭**陳久
酒浸煎濃吐衄血來服亦即止**茅筭**老屋上及得醬
汁和研斑瘡蠶咬瘡可敷**茅筭**收治鼻洪尤驗
取**茅筭**飲殺雲母石毒須知○又種**茅筭****音****北**
甘溫無毒亦止吐衄可貼灸瘡

僊茅

味辛氣溫有毒西域多有蜀浙亦生葉青似茅

故此為譽其根獨莖而直旁附細根肉肉黃白多涎
外皮籠褐二月八月採根曝乾梵語呼阿輪乾陀南
人呼婆羅門蜜咀禁鐵器製浸米泔去赤汁毒出無
防忌兩般牛肉牛乳主心腹冷氣不能食療腰足攣

痺不能行。丈夫虛損勞傷。老人失溺無子。益肌膚。明耳目。助陽道。長精神。久久服之。通神強記。傳云。十斤乳石。不及一斤僊茅。亦表其功力爾。誤服中毒。舌脹者。急飲大黃汁。數杯。仍以末搽舌間。遂旋愈也。

蔓菁

味甘氣大寒。無毒。種類不一。地產亦殊。川蜀

者。作花大蔓。堪觀。

蔓菁中抽餘作花初生大蔓如倒垂莖苗

閩廣者。結實

極美。可噉。他處雖有。花實俱無。近歲都下。往往種之。

並係芭蕉莖葉頗同。實非共一種也。此指有子者爲

是。須待立秋後採根。絞汁服。主天行狂熱。悶煩。悞服

金石燥渴。產後脹悶。奇効。悉臻。搗爛敷。去小兒赤遊

丹毒。大人瘰癧。瘰癧。風癰。頭瘡。神功立應。**蔓菁**在於

皮內竹筒插入吸來。如煩渴飲差。須髮塗黑。暗風
癰悶。暈欲倒。急飲下一吐便甦。生青熟黃可曝乾。
寄遠北地。以爲珍菓。每蒸熟取仁。潤心肺生津。通
血脉填髓。性雖相類。醫方內不載。拯痾但
吸其油。亦能黑髮。

景天 味苦酸。氣平。無毒。一云有小毒。人家園亭多以
盆植。莖葉堅厚。隨插隨生。俗名掛壁青。謂無土養不
瘁。又名慎火草。因治火瘡立差。煎湯浴小兒熱刺癩
瘡。搗爛敷小兒赤遊丹毒。金瘡蠱毒。兼療風驚熱燥。
總醫 香細淺紅。帶赤白能止。

徐青

味辛。氣溫。無毒。淄齊淮間俱有。卑濕川澤。纔

生春煖茂榮冬寒枯稿葉如柳葉兩兩相當根紫細
辛臨隔短小氣鱗亦似三月採收釐杵以少蜜拌勻
磁甕蒸三伏曝用去蠱毒疫疾殺鬼物精邪溫瘡祛
惡氣逐久服強悍輕身延年

黃蘗

味苦氣平無毒藤生三四尺高莖根與小桑

類萬州

黃蘗

者緊重他處者輕虛十月採根外科多

用主咽喉痺寒及諸惡腫毒瘡疽治蛇犬咬傷併馬
走心肺積熱生搗取汁亦含亦塗肉味酸消癭甚
捷收須浸酒日飲數杯見効即停不爾項縮

石龍

味苦氣寒微溫無毒生長山谷濕地九節多

味者良又名龍鬚織蓆堪用五月採莖日曝九月採

根陰乾。通小便不利。熱淋。除內傷不足。虛痞。殺鬼疰。惡毒。去尿管澀疼。潤皮毛。稿枯。卻心腹邪氣。久服延壽。明目輕身。○敗毒煎湯治淋亦効。

石菖蒲

味苦。氣平。無毒。雖生川澤。惟出益州。蜀四一

叢數莖。一莖三葉。葉兩兩短小多缺。子綴綴。色黃。味

辛。

如草

又云。有兩種類。水生者。葉光澤。子圓。陸生者。

葉有毛。子銳。入藥劑。內水生者佳。二月八月採。戊五月五日收子。以大戟爲使。畏蛇蛻。是菜。平。胃氣欠和。胃熱作滿。補陰氣不足。莖冷失精。風寒濕痺。齊。心腹和氣。竟解。通利閼。鄮。悅澤皮膚。久服明目輕身。令人結孕育子。其陸生者。天灸另名。取少葉。係繫臂上。

一宵作大泡狀如火熖掀赤等患懸隔不可不知

絡石

味苦氣溫微寒無毒陰山峻壁隨處有之多包

絡石間或蔓延木上莖節著處即生根鬚葉圓凌冬
常青花白結子細黑與薜荔木連地錦石血等同一
類爲人家亭園石山亦每種爲翫飾採莖葉入藥擇
附石爲良畏貝母菖蒲使牡丹杜仲喉閉不通欲絕
水煎湯下立甦背癰掀腫延開蜜和汁服即効堅筋
骨強健腰足利關節潤澤容顏去風熱死肌解口舌
乾燥蛇毒心悶能散刀斧瘡口可封久服輕身通神
明目延年耐老○**薜荔**雖同絡石莖葉龜大如藤治
背癰將葉採收煎酒飲下利即愈○**石血**味苦附本

而生苗。藤似寄生。質綠。直上枝葉如石。葉豐厚且圓。
任採煎湯。或收浸酒。初服壯陽卻病。久服耐老延年。
藤取之。堪敷風毒。掃白癩。風癰。除疥癬。癰瘍。**生**
大類蓮房。一年一熟。**藤**劈內多白汁。久漸黑。疑破血。
甚良。依時收採。子亦入藥。並載圖經。○**藤**味甘。葉
如鴨掌。藤蔓著地。隨節有根。亦綠。木石沿長。每耐寒。
凍不瘁。煎湯浸酒。破血止疼。祛產後血凝。逐腹中血。
復。○又種**藤**亦以血攻。狀與絡石相同。但葉尖而
半赤。石崖多產。收取無時。煎酒建功。墮胎亦速。